


# Septanest 1:100.000

Não Perca Anestesia Nem Tempo! Maior Segurança e Economia!

Anestésico com ótima difusibilidade e hemostasia!  
Excelente para casos cirúrgicos!



Cloridrato de articaína 4%  
Adrenalina 1:100.000



Anestésico tipo amida que contém um grupo tiofeno.


## CARACTERÍSTICAS PECULIARES

- Altamente eficiente: possui maior lipossolubilidade e melhor difusão nos tecidos ósseos e moles;
- Potente: a alta conjugação protéica garante qualidade, profundidade e excelente tempo de trabalho;
- Toxicidade similar a lidocaína e prilocaína metabolizada no plasma sanguíneo e no fígado.

## PROPRIEDADES


Latência:	30 seg a 2 min
Toxicidade:	1.5
Anestesia Pulpar:	75 a 90 minutos
Anestesia de tecido mole:	3 a 6 horas

Único com esterilização final, não contendo conservantes.



## INDICAÇÕES

Este medicamento é indicado para adultos e crianças acima de 4 anos, em anestesia local ou loco-regional dentária. Dentísticas extensas, procedimentos cirúrgicos em geral, enxertos ósseos e periodontais, implantodontia, endodontia e periodontia .



Maior economia e segurança!

Dose Máxima	
Crianças 5mg/kg	2 tubetes
Adultos 7mg /kg	7 tubetes
> de 65 anos	3 tubetes



# Septanest 1:100.000 Excelente anestésico para cirurgias extensas

## SEPTANEST COM ADRENALINA A 1:100 000

Solução Injetável

### Leia atentamente a íntegra desta bula, antes de utilizar este medicamento. Ela contém informações importantes.

Caso tenha outras perguntas, caso haja uma dúvida, solicite maiores informações às autoridades de saúde ou ao comerciante desta especialidade.

Este medicamento deve ser prescrito e utilizado para um paciente específico. Não deve ser destinado a qualquer outro, mesmo em caso de sintomas idênticos, pois isto poderia ser-lhe nocivo. Guarde esta bula: você poderá precisar usá-la novamente como referência.

### FORMA FARMACÊUTICA:

Solução injetável

### APRESENTAÇÃO:

1,8 ml em tubete (vidro) com pistão (borracha), estojos de papelão de 50 tubetes

### COMPOSIÇÃO:

Cloridrato de articaína..... 72,000 mg  
Tartarato de adrenalina: bitartrato de epinefrina..... 0,033 mg  
Quantidade correspondente à epinefrina de base..... 0,018 mg  
Excipientes: cloreto de sódio, metabisulfito de sódio, edetato de sódio, solução de hidróxido de sódio, água para preparações injetáveis.  
Para um tubete de 1,8 ml

### INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS:

Este medicamento é indicado para adultos e crianças acima de 4 anos, em anestesia local ou loco-regional dentária.

### POSOLOGIA E MODO DE USAR:

Reservado aos adultos e às crianças com mais de 4 anos:

• adultos: a quantidade a ser injetada será adaptada em função da importância da intervenção. Como regra geral, de meio a um tubete para uma intervenção comum.

Não ultrapassar a dose de 7 mg de cloridrato de articaína por quilograma de peso corporal.

• Crianças com mais de 4 anos: adequar à idade, ao peso da criança e à importância da intervenção. A dose média é de 5 mg de cloridrato de articaína por Kg de peso (0,125 ml de solução anestésica).

• Pacientes idosos: redução de metade da dose reservada ao adulto.

A dose máxima de cloridrato de articaína administrável a uma criança é:

Peso da criança (em quilos) x 1,33

A velocidade da aplicação não deve ultrapassar 1 ml por minuto.

### Modo de usar:

O diafragma será desinfetado no momento do uso, e assim deverá ser feito com todos os cartuchos. Ele será cuidadosamente rompido:

• ou com álcool etílico a 70%

• ou com álcool isopropílico puro para uso farmacêutico a 90%.

Os cartuchos jamais deverão ser imersos em qualquer tipo de substância.

Não misturar a solução injetável numa mesma seringa com outros produtos.

Todo tubete aberto de solução anestésica não deverá ser reutilizado.

### Modo e via de administração

Injeção local ou regional intrabucal sob mucosa. Controlar para que não haja rompimento vascular, através de repetidos testes de aspiração, em particular por ocasião da anestesia regional (troncular).

A velocidade da injeção não deve ultrapassar 1 ml de solução por minuto.

### ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES:

ESTE PRODUTO CONTÉM ADRENALINA a 1/100 000.

- Levantar em conta um risco de necrose local em pacientes hipertensos ou diabéticos
- Risco de anestesiofagia: mordidas nos lábios, bochechas, língua; evitar a ingestão de alimentos ou de mascar chicletes durante o tempo em que a boca e/ou a garganta permanecerem insensíveis.
- Na criança com menos de 4 anos, esse produto não é recomendado em razão da técnica anestésica não adaptada para esta idade.
- Evitar a injeção nas zonas infectadas e inflamatórias (redução da eficácia do anestésico local)

### Precauções

A utilização deste produto exige de forma imperativa e prévia:

- um interrogatório destinado a sondar o terreno, os tratamentos em curso e os antecedentes do paciente.
  - A aplicação de uma injeção-teste de 5 a 10% da dose em caso de risco alérgico
  - A aplicação da injeção lentamente, sempre fora dos vasos, controlando-a através de aspirações repetidas
  - Manutenção do contato verbal com o paciente
- A vigilância deve ser ainda maior nos pacientes sob anticoagulantes.

Devido à presença da adrenalina, precauções e vigilância ainda maiores nos seguintes casos:

- todos os transtornos do ritmo, exceto as bradicardias;
- insuficiência coronariana;
- hipertensão arterial severa

Em caso de insuficiência hepática grave, pode ser necessário reduzir as doses de articaína, devido ao metabolismo, principalmente hepático, dos anestésicos locais de função amido.

A posologia deve ser igualmente reduzida nos casos de hipoxia, de hipercalemia ou de acidose metabólica.

### INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS:

PARA EVITAR EVENTUAIS INTERAÇÕES ENTRE VÁRIOS MEDICAMENTOS, É PRECISO ASSINALAR SISTEMATICAMENTE QUALQUER OUTRO TRATAMENTO EM CURSO.

A associação da guanetidina e de medicamentos aparentados (antiglaucomatosos) é totalmente desaconselhada.

Precauções de emprego sob rigoroso controle médico são necessárias com:

- todas as classes de medicamentos antidepressores: IMAO (iproniazida, moclobemida, toloxatona), imipramínicos, serotoninina-energéticos e noradrenalina-energéticos (descrito para minalcipran e venlafaxina) cujo aporte deve ser limitado; por exemplo: menos de 0,1 mg de epinefrina em 10 minutos ou 0,3 mg em uma hora para o adulto
- os anestésicos voláteis alógenos (aumento da reatividade cardíaca) cujo aporte deve ser igualmente limitado; por exemplo: menos de 0,1 mg de epinefrina em 10 minutos ou 0,3 mg em uma hora para o adulto.

Deve-se chamar a atenção dos esportistas para o fato de que este medicamento pode induzir a uma reação positiva em certos testes praticados por ocasião dos controles antidoping.

### GRAVIDEZ E LACTAÇÃO:

A utilização deste medicamento não deve ser considerada durante a gravidez e lactação, a menos que seja necessário.

"Informe ao seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término. Informe ao seu médico se está amamentando."

### Aleitamento

A continuidade do aleitamento é possível no decorrer da anestesia dentária.

### CONTRA-INDICAÇÕES:

Este medicamento NUNCA DEVE SER UTILIZADO nos casos de hipersensibilidade (alergia) aos anestésicos locais do mesmo grupo químico ou a um dos componentes e nas seguintes situações:

- perturbações graves da condução auriculoventricular e não aparelhadas;
- epilepsia não controlada por um tratamento;
- porfiria.

Exceto parecer contrário de um médico, este medicamento, DE FORMA GERAL, NÃO DEVE SER UTILIZADO em caso de tratamento pela guanetidina e produtos aparentados (antiglaucomatosos).

### SUPERDOSAGEM:

Podem ocorrer reações tóxicas, provas de uma superdosagem em anestésico local, em duas condições:

- ou imediatamente, por superdosagem relativa a uma passagem intravenosa acidental
- ou, mais tarde, devido a uma verdadeira superdosagem devida à utilização de uma quantidade exagerada de anestésico.

### Conduta a ser seguida

A partir do surgimento de sinais de alerta, solicitar ao paciente para que respire fundo (hiperventilação), colocá-lo em posição alongada, se for o caso.

Diante do surgimento de clonos, pode ser necessária a intubação com ventilação assistida.

### PRAZO DE VALIDADE:

O prazo de validade é de 2 anos.

### CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO:

Conservar a uma temperatura não superior a 25°C e ao abrigo da luz. Não congelar.

NÃO FAZER USO DO MEDICAMENTO APÓS A DATA LIMITE QUE FIGURA NO LADO EXTERNO DA EMBALAGEM.

NÃO FAZER USO DO MEDICAMENTO CASO HAJA SINAIS VISÍVEIS DE DETERIORAÇÃO.

Reg. ANVISA N°: 153730003.002-3

RESP. TÉCN.: Denilton Silva Costa  
CRFSP no. 31674

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:

Marquart e Cia. LTDA  
Av. Piracema, 1411 – Box 12  
Cep : 06460-030 – Barueri – São Paulo – BRASIL  
Tel: (11) 2141-1999  
CNPJ: 60.836.43.0001-89

FABRICADO POR:

Laboratórios SEPTODONT  
58, rue du Pont de Créteil  
94107 SAINT-MAUR-DES-FOSSES – FRANÇA  
www.septodont.com.br



SEPTODONT BRASIL LTDA.  
Al. Pucuruí, 166 - Tamboré - Barueri - SP  
CEP: 06460-100  
Tel: (11) 4688-0789 - Fax 4689-1577  
E-mail: septodont@septodont.com.br  
http://www.septodont.com.br