



<p>Dor de dente</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Enxaguar a boca com água morna. • Passar o fio dental para remover restos alimentares entre os dentes. Se houver inchaço, fazer compressas frias na parte externa da bochecha. Não aplicar nada quente e não colocar nenhum remédio no dente nem na gengiva. • Consultar um dentista, assim que possível.
<p>Objeto preso entre os dentes</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tentar remover o objeto com fio dental. Guiar o fio dental com muito cuidado para evitar que a gengiva seja machucada. • Se for impossível remover o objeto, consultar um dentista. • Não tente remover o objeto com faca ou outro instrumento pontiagudo.
<p>Dente arrancado por acidente (trauma dental)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Levar a criança e o dente ao dentista, imediatamente. • Colocar o dente em recipiente com leite, água com sal ou saliva da criança. • Se isso não for possível, usar apenas água. • Caso não seja possível ir ao dentista imediatamente prossiga da seguinte forma: <ul style="list-style-type: none"> - Enxaguar o dente com cuidado em água morna. Não encostar na raiz do dente. - Dente permanente: encaixar o dente com muito cuidado no local da gengiva de onde caiu. - Dente de leite: não tente encaixar o dente de leite de volta na gengiva. - Colocar em leite frio ou água e levar junto ao dentista. • Ir ao dentista em até 30 minutos, se possível.
<p>Dente quebrado</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Com muito cuidado, limpar a sujeira ou restos da área machucada, com água morna. • Colocar compressas frias na face, na área do dente machucado, para diminuir o inchaço. • Fazer pressão diretamente na área com sangramento, com um pano limpo. • Ir ao dentista imediatamente.
<p>Mordida no lábio ou na língua</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fazer pressão diretamente na área com sangramento, com um pano limpo. • Em caso de inchaço, fazer compressas frias. • Se continuar o sangramento, ir a um pronto-socorro.

QUESTÕES DE SAÚDE

Em caso de acidente.....

- Manter a calma e transmitir segurança para a criança.
- Estancar ou controlar o sangramento (fazendo pressão).
- Avisar os pais ou responsáveis.
- A criança deve ser levada ao dentista para tratar do dente ou da área machucada.

Colgate®